

ANÁLISE DOS RESULTADOS DE EXAMES DE PAPANICOLAOU DE MULHERES ATENDIDAS NO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DA FAMÍLIA (CEDEFAM) EM FORTALEZA.

XXV Encontro de Extensão

Matheus de Souza Santos, Iandra Prado Magalhães, Ícaro Camilo Belmino Girão, Rita de Cassia Carvalho Barbosa

O colo uterino é tanto uma sentinela para infecções potencialmente graves do trato genital superior, quanto um alvo de carcinógenos virais, químicos e outros. A suscetibilidade do trato genital feminino às infecções, variam de acordo com a idade e a localização anatômica, assim como o câncer do colo do útero é um importante problema de saúde pública, especialmente nos países em desenvolvimento, e tem uma alta incidência e mortalidade. Embora tenha alta incidência, este câncer apresenta forte potencial de prevenção e cura quando diagnosticado precocemente, seja por meio de consultas regulares ao ginecologista seja pela realização regular dos exames recomendados (Papanicolaou e Colposcopia) a partir dos 25 anos de idade. Nesse contexto, a análise dos aspectos sócio-demográficos, história ginecológica e aspectos comportamentais, determinam os fatores predisponentes para essas alterações cervico-vaginais. Assim o presente estudo teve como objetivo analisar os resultados citopatológicos, empregados para o rastreamento do câncer do colo do útero, nas mulheres atendidas no Centro de Desenvolvimento da Família (CEDEFAM). O estudo não contou com nenhum financiamento. Dos 479 laudos analisados, verificou-se que em 75,6% (362 casos) foi constatado algum grau de inflamação e que em 2,7% (13 pacientes) foram observadas alterações celulares sugestivas de pré-malignidades. A frequência majoritária da faixa etária das pacientes evidenciou um grupo jovem, no qual 71,4% das mulheres estão incluídas na faixa etária entre 11 a 42 anos. Nota-se que 69,8% das gestantes apresentaram algum grau de inflamação. Conclui-se que há uma prevalência considerável para processos inflamatórios na amostra estudada, sugerindo que medidas profiláticas devam ser mais frequentemente adotadas com o objetivo de reduzir a ocorrência desses processos, que futuramente poderá levar ao desenvolvimento de processos pré-malignos ou malignos do colo uterino.

Palavras-chave: Exame de Papanicolaou. Câncer do colo uterino. Triagem.