

# O PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO PROJETO DE ASSISTÊNCIA E PREVENÇÃO DAS DISFUNÇÕES DO JOELHO.

XXV Encontro de Extensão

Yanka Aparecida Bandeira Murakawa, Maria Larissa Azevedo Tavares, Ana Laís Cidade Amâncio, Gabriel Peixoto Leão Almeida, Pedro Olavo de Paula Lima, Gabriel Peixoto Leão Almeida

O Perfil Epidemiológico Dos Pacientes Atendidos Pelo Projeto De Assistência E Prevenção Das Disfunções Do Joelho (Projeto de Assistência e Prevenção das Disfunções do Joelho - Cadastro: QA74.2014.PJ.0061) Introdução: Dentre as enfermidades que acometem o sistema musculoesquelético, a dor no joelho destaca-se com uma prevalência global de 20%. Diante disso, o Projeto de Assistência e Prevenção das Disfunções do Joelho (PAPO-joelho) surge com o intuito de realizar prestação de serviços assistenciais e preventivos à saúde de pacientes com patologias ou com fatores de risco para desenvolvimento destas na articulação do joelho, que necessitam de avaliação e/ou tratamento fisioterapêutico. Objetivos: Apresentar o perfil epidemiológico dos pacientes atendidos pelo projeto desde sua criação em 2014 até o presente ano de 2016. Metodologia: Foi realizada, primariamente, a coleta de dados através das fichas de todos os pacientes atendidos, de 2014 a 2016. Por conseguinte, foi realizada a análise estatística dos dados obtidos, que foram agrupados em dados do perfil epidemiológico dos pacientes, a saber: idade, gênero, tempo de lesão, dor na Escala Visual Analógica de Dor (EVA) e mecanismo de lesão. Resultados: A respeito do perfil dos pacientes obteve-se de 55 pacientes atendidos, a média de idade destes foi de 31,84 anos  $\pm$  13,86, sendo 59,62% do sexo feminino; o tempo médio em meses da lesão em que os pacientes se encontraram ao chegar ao projeto foi de 41,54  $\pm$  62,74 (min. 0,5 e máx 276 meses), a média da EVA foi de 5,19  $\pm$  2,51 e o mecanismo de lesão mais prevalente foi microtrauma com 40,82%, seguido de trauma direto com 32,65% e trauma indireto com 26,53%. Conclusão: Os resultados encontrados indicam uma predominância de pacientes adultos, do sexo feminino, que possuem por alguns anos, dores moderadas e causadas por microtraumas.

Palavras-chave: Perfil de Saúde. Assistência Ambulatorial. Relações Comunidade-Instituição.